

Trồng Dưa Chuột Bao Tử

Các giống dưa bao tử có đặc điểm sinh trưởng khỏe, năng suất cao, nhiều hoa cái, quả lớn nhanh, mỗi chùm 2 - 3 quả

Dưa chuột bao tử dùng để dầm dấm hoặc muối mặn để xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con nông dân. Để việc trồng dưa bao tử đạt năng suất cao, bà con chú ý một số điểm sau:

* **Giống:** Thường các giống dưa để trồng dưa bao tử là các giống dưa F1 của Nhật, Mỹ, Thái Lan, Hà Lan (Ninja 179, Marinda, Happy 02, Mummy 331...) có đặc điểm sinh trưởng khỏe, năng suất cao, nhiều hoa cái (khoảng hơn 95% số hoa), quả lớn nhanh, mỗi chùm 2 - 3 quả. 1 sào Bắc Bộ (360m²) giao hết 30 – 35 gam hạt.



* **Thời gian trồng:** có thể gieo từ 15/9 đến 10/10. Nhưng tốt nhất là từ 15/9 đến 25/9. Nếu trồng cây dưa trên đất 2 vụ lúa sẽ cho năng suất cao và ổn định hơn.

* **Cách trồng:**

+ Chọn đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ ; nơi chủ động tưới tiêu. Phải làm kỹ.

+ Bên luống rộng khoảng 1,1m–1,2 m cao khoảng 30 cm. Hạt gieo thành 2 hàng trên luống cách nhau 60 cm, gốc nọ cách gốc kia 40 cm. Các gốc trên 2 hàng nên bố trí so le

nhau để tận dụng tốt ánh sáng mặt trời.

*** Phân bón:** Một sào Bắc Bộ (360m²) cần phân chuồng ủ mục 7–8 tạ, đạm Urê 5–6 kg, Kali Sunfat 7–8 kg, Lân 12–15 kg. Nếu đất chua thêm 20–25 kg vôi bột.



Cách làm: vôi bột rắc đều trước khi cày bừa. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân, 50% đạm và Kali, bón ở giữa 2 gốc cách hạt dưa từ 10 đến 15 cm; gieo xong phủ một lớp rơm rạ băm nhỏ hoặc trấu lên bề mặt luống.

*** Chăm sóc:**

- Khi cây có 4–5 lá, lúc dưa mọc tua cuốn thì xới vun kết hợp bón thúc. 25% đạm và kali. Bón thúc cách gốc khoảng 25 cm.

- Cắm giàn cho dưa leo, mỗi gốc cần từ 1–2 cây cắm xéo (hình chữ x, còn gọi là chéo cánh sè). Khi cắm giàn cần phải cột chắc, sau đó dùng dây mềm cột ngọn dưa đưa lên giàn - cứ 3–5 ngày cột một lần cho đến khi cây ngừng sinh trưởng (khi đã thu 3–4 lúc quả). Khi dưa được 10–12 lá bón lót hết lượng phân đạm, kali còn lại. Tỉa bỏ lá già, lá bệnh, làm sạch cỏ dại để gốc dưa luôn luôn thoáng. Hàng ngày, dùng nước sạch để tưới. Sau mỗi đợt hái quả nên tưới cho dưa bằng nước phân chuồng đã ủ hoại mục.



- Dùng các loại thuốc nam như hạt củ đậu, lá thuốc Lào, thuốc lá hoặc vi sinh như BT, Delfin, Dipen để trừ sâu xanh, sâu khoang cắn lá, sâu đục quả. Dùng thuốc Actara để trừ các loại rầy rệp. Trừ nhện đỏ, nhện trắng bằng Daniton, Pegasus, Dany. Nếu dưa bị lở cổ rễ, phần trắng, chạy dây, héo xanh thì dùng Tilt, Tilt – Super, Canvin. Chú ý xem kỹ cách sử dụng từng loại thuốc đã ghi trên bao bì gói thuốc.

*** Thu hoạch:**

Thường thì hái vào lúc quả dài 3–4cm, đường kính 2–2,5cm, khoảng 2 ngày một lần. Nên chế biến ngay trong ngày để dưa tươi ngon.