

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây roi đỏ Thái Lan

1 Thời vụ trồng

Roi đỏ Thái Lan được trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên, nếu trồng với lượng ít ta có thể trồng vào nhiều thời vụ khác nhau, miễn là phải tránh thời điểm nắng nóng và rét đậm.

2 Mật độ trồng roi đỏ Thái Lan

Mật độ thích hợp nhất là 4x4m, hàng cách hàng 5m.

* Làm đất, bón lót và trồng cây roi đỏ

- Làm đất:



+ Vùng đất rừng: Làm mô trồng rộng 0,6-0,8m, cao 0,3-0,6m.

+ Đất dốc: Nếu độ dốc nhỏ hơn 7%, hốc trồng ngang bằng mặt đất. Đất quá dốc, hốc trồng có thể thấp hơn mặt đất 10-20cm.

- Bón lót: Mỗi mô có thể bón lót 0,5kg vôi bột, 0,3kg phân lân, 5-10kg phân hữu cơ hoai mục.

- Cách trồng: Móc một hốc nhỏ ở giữa vị trí trồng. Rọc đáy túi đựng bầu. Đặt cây vào vị trí, và rọc một đường từ trên xuống để lấy túi đựng bầu ra. Lấp đất giữ chặt cây. Cắm cọc cố định cây (cột cây bằng dây nilon).

3 Kỹ thuật chăm sóc roi đỏ Thái Lan

- Giữ ẩm: Sử dụng các vật liệu dễ tìm như rơm rạ, cỏ khô đập phủ xung quanh gốc để giữ ẩm.

- Tưới tiêu: Cung cấp nước cho cây thường xuyên nhất là ở thời kỳ mới trồng, hay khô hạn kéo dài. Cây roi đỏ chuẩn bị ra hoa, cần giữ cho gốc cây khô ráo. Thời kỳ mang trái, cây rất cần nhiều nước để nuôi trái. Thiếu nước năng suất kém, phẩm chất giảm và trái nhỏ.

- Tia cành tạo tán: tia bỏ cành vượt, cành già cỗi, sâu bệnh, tạo thông thoáng giúp cây quang hợp tốt. Không chế chiều cao cây roi đỏ khoảng 3,5m trở lại.

- Bồi đất cho cây:

Hàng năm nên bồi thêm đất cho cây vào đầu mùa khô như bùn ruộng, đất khô dày 2-3cm, xung quanh và bón phân hữu cơ hay phân hóa học.

- Bón phân:

+ Phân hữu cơ: Bón 10-15 kg phân hữu cơ hoai mục như: Phân trâu bò, heo, dê, rơm rác mục.

Cách bón: Có thể bón xung quanh tán cây và bồi lớp đất bùn mỏng hay đào 3-4 hố kích thước 40x40x40 cm ở khoảng giữa tán cây bón phân vào hố và lấp đất lại.

+ Phân hóa học: Năm thứ nhất: Bón cho cây roi đỏ khoảng 50 gram phân NPK 16-16-8. chia ra 4-5 lần bón trong năm; năm thứ hai bón gấp đôi lượng phân năm thứ nhất, chia ra 3-4 lần bón; thời kỳ cho hoa trái bón 1,5-3kg phân NPK 20-20-15, chia ra làm nhiều lần bón (nên cắt bỏ bớt 50-60% bông trái nhằm giúp tăng phẩm chất). Cần tăng cường Kali và Canxi nhằm giúp trái roi Thái Lan có màu tươi đẹp và vị ngọt hơn. Thu hoạch xong có thể bón tiếp cho cây 0,5-1 kg phân NPK 20-20-15 cho cây nhanh chóng phục hồi để cho hoa trái đợt tiếp theo.

4 Phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây roi đỏ Thái Lan

* Sâu rầy gây hại

+ Sâu ăn lá: Là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá đợt non làm bộ lá còi cọc xơ xác. Dùng các loại thuốc BVTV xử lý: Vifast 5ND, Desic 2,5 ND, Basudin 50EC...

+ Rầy mềm, rệp sáp, rệp dính: Tấn công chồi non, cuốn lá, cuốn trái làm cành lá quăn queo, bị muội hóng làm đen trái... Có thể dùng Basan 50ND, Supracide 40ND, Polytrin

10ND...

+ Sâu đục thân, đục cành: Ấu trùng đục vào cành, thân làm cho cành bị khô có thể bị gãy ngang. Đầu tiên chúng khoét những đường hang ngoằn -ngèo, hay đục sâu vào thân cây, cây suy kiệt dần rồi chết. Có thể dùng Vibasu 10H, Vicarp 10H, Regent... để xử lý định kỳ xung quanh gốc, hay sử dụng các loại thuốc có tính lưu dẫn để xịt phòng cho cây.

+ Sâu đục trái: Chúng đục sâu vào bên trong trái, đục phân ra ngoài làm giảm phẩm chất trái. Dùng các loại thuốc sâu có độc tính thấp để phun phòng ngừa như: Polytrin P40 ND, Vertmec 1,8 ND, Treon... xịt định kỳ vào giai đoạn trái còn nhỏ và bao trái HFHYTFi.

+ Ruồi đục trái: Dùng chất dẫn dụ sinh học Vizubon- D hay Protêin thủy phân để

bẫy ruồi. Với cách diệt ruồi đục trái này sẽ không gây ô nhiễm môi trường, giúp tăng chất lượng của cây trái. Có thể dùng túi nilon để bao bọc trái sau khi đã xử lý thuốc phòng trừ sâu rầy và nấm bệnh.

* Bệnh hại

Trên roi, bệnh gây hại không quan trọng lắm. Cần lưu ý phòng bệnh vào giai đoạn sau khi đậu trái, phòng chống bệnh thối nhũn trái roi đỏ, có thể sử dụng: Ridomyl MZ 72 BHN, Tilt 250 ND, Score 250 ND... liều dùng theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.

4. Thu hoạch roi đỏ

Thu hái khi quả đã đủ độ chín phù hợp nhất cho vận chuyển đến nơi tiêu thụ mà không ảnh hưởng chất lượng. Roi có vỏ mỏng, rất dễ tổn thương xây xát, khi thu hái cần nhẹ tay, có dụng cụ chứa đựng phù hợp để tránh dập nát khi thu hái và vận chuyển.

Theo nhanong.net