



BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI

HÓA HỌC 11

I. Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li

Câu 1: Nồng độ mol của anion trong dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 0,10M là

- A. 0,10M. **B. 0,20M.** C. 0,30M. D. 0,40M.

Câu 2: Nồng độ mol của cation trong dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 0,45M là

- A. 0,45M.** B. 0,90M. C. 1,35M. D. 1,00M.

Câu 3: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2M và 300 ml dung dịch Na_2SO_4 0,2M có nồng độ cation Na^+ là bao nhiêu?

- A. 0,23M. B. 1M. **C. 0,32M.** D. 0,1M.

Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH^- trong dung dịch X là

- A. 0,65M. B. 0,55M. **C. 0,75M.** D. 1,5M.

Câu 5: Trộn 150 ml dung dịch MgCl_2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl^- có trong dung dịch tạo thành là

- A. 0,5M. **B. 1M.** C. 1,5M. D. 2M.

Câu 6: Nồng độ mol của anion trong dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 0,10M là

- A. 0,10M. **B. 0,20M.** C. 0,30M. D. 0,40M.

Câu 7: Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na^+ , Cl^- , H^+ trong dung dịch X lần lượt là



A. 0,2; 0,2; 0,2.

B. 0,1; 0,2; 0,1.

C. 0,2; 0,4; 0,2.

D. 0,1; 0,4; 0,1.

II. Pha chế dung dịch

Câu 1: Pha loãng dung dịch 1 lít NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới có pH = 8. Thể tích nước cần dùng là?

A. 5 lít.

B. 4 lít.

C. 9 lít.

D. 10 lít.

Câu 2: Pha loãng 1 lít dung dịch NaOH có pH = 13 bằng bao nhiêu lít nước để được dung dịch mới có pH = 11?

A. 9.

B. 99.

C. 10.

D. 100.

Câu 3: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

A. 5.

B. 4.

C. 9.

D. 10.

III. Phản ứng axit - bazơ

1. Phản ứng trung hòa

Câu 1: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,1.

B. 0,3.

C. 0,2.

D. 0,4.

Câu 2: Cho 50 ml dung dịch HNO_3 1M vào 100 ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,5.

B. 0,8.

C. 1,0.

D. 0,3.

Câu 3: Để trung hòa 40 ml dung dịch H_2SO_4 0,25M cần 50 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,1.

B. 0,2.

C. 0,3.

D. 0,4.

Câu 4: Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là

A. 1,0M.

B. 0,25M.

C. 0,5M.

D. 0,75M.

Câu 5: Để trung hòa hoàn toàn dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$ thì cần bao nhiêu lít



dung dịch chứa HCl 0,1M và H_2SO_4 0,05M?

- A. 4. B. 1. C. 3. **D. 2.**

Câu 6: Đổ 10 ml dung dịch KOH vào 15 ml dung dịch H_2SO_4 0,5M, dung dịch vẫn dư axit. Thêm 3 ml dung dịch NaOH 1M vào thì dung dịch trung hoà. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là

- A. 1,2M.** B. 0,6M. C. 0,75M. D. 0,9M.

Câu 7: Dung dịch X chứa KOH 0,2M và $Ba(OH)_2$ 0,1M. Dung dịch Y gồm H_2SO_4 0,25M và HCl 0,75M. Thể tích dung dịch X cần vừa đủ để trung hòa 40 ml dung dịch Y là

- A. 0,063 lít. **B. 0,125 lít.** C. 0,15 lít. D. 0,25 lít.

Câu 8: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H_2 (đktc). Thể tích dung dịch axit H_2SO_4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là

- A. 150 ml. **B. 75 ml.** C. 60 ml. D. 30 ml.

Câu 9: Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO_3 b mol/l. Để trung hòa 20 ml dung dịch X cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,1M. Mặt khác, lấy 20 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ dư thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. Giá trị của a, b lần lượt là

- A. 1,0 và 0,5.** B. 1,0 và 1,5. C. 0,5 và 1,7. D. 2,0 và 1,0.

Câu 10: Để trung hòa 100 ml dung dịch H_2SO_4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là

- A. 200.** B. 150. C. 50. D. 100.

Câu 11: Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M và H_2SO_4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa NaOH 3M và $Ba(OH)_2$ 4M thì trung hòa vừa đủ. Thể tích V là

- A. 0,180 lít. **B. 0,190 lít.** C. 0,170 lít. D. 0,140 lít.

Câu 12: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M, H_2SO_4 0,2M và H_3PO_4 0,1M với những thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và $Ba(OH)_2$ 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là

- A. 600. B. 1000. C. 333,3. **D. 200.**

Câu 13: Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$ vào nước được 500 gam dung dịch X. Để trung hòa 50 gam dung dịch X cần dùng 40 gam dung dịch HCl 3,65%. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được khối lượng muối khan là



A. 3,16 gam.

B. 2,44 gam.

C. 1,58 gam.

D. 1,22 gam.

2. Bài tập về pH

Câu 1: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M, thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 2: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO₃ 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có giá trị pH bằng

A. 9.

B. 12,30.

C. 13.

D. 12.

Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)₂ 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H₂SO₄ 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 7.

B. 2.

C. 1.

D. 6.

Câu 4: Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng

A. 0,23.

B. 2,3.

C. 3,45.

D. 0,46.

Câu 5: Để trung hoà 100 gam dung dịch HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)₂ có pH bằng 13?

A. 500 ml.

B. 0,5 ml.

C. 250 ml.

D. 50 ml.

Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO₃ 0,3M và HClO₄ 0,5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)₂ aM, thu được dung dịch có pH = 3. Vậy a có giá trị là

A. 0,39.

B. 3,999.

C. 0,399.

D. 0,398.

Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO₃ với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l), thu được 200 ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 8: Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M và H₂SO₄ 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là

A. 0,13M.

B. 0,12M.

C. 0,14M.

D. 0,10M.

Câu 5: Trộn 3 dung dịch H₂SO₄ 0,1M, HCl 0,2M và HNO₃ 0,3M với thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Cho 300 ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)₂ 0,1M được



dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là

- A. 0,06. **B. 0,08.** C. 0,30. D. 0,36.

Câu 6: Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H_2SO_4 aM và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp $Ba(OH)_2$ bM và KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z có pH = 12. Giá trị của a và b lần lượt là

- A. 0,01M và 0,01M. B. 0,02M và 0,04M.
C. 0,04M và 0,02M. **D. 0,05M và 0,05M.**

Câu 7: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M và H_2SO_4 0,01M với 250 ml dung dịch $Ba(OH)_2$ có nồng độ xM, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và x là

- A. 0,5825 và 0,06.** B. 0,5565 và 0,06. C. 0,5825 và 0,03. D. 0,5565 và 0,03.

Câu 8: Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,25M và $Ba(OH)_2$ 0,15M, dung dịch Y chứa hỗn hợp H_2SO_4 0,5M và HNO_3 0,2M. Trộn V lít dung dịch X với V' lít dung dịch Y, thu được dung dịch Z có pH = 3. Tỷ lệ V/V' là

- A. 2,17. B. 1,25. **C. 0,46.** D. 0,08.

Câu 9: Trộn hai dung dịch H_2SO_4 0,1M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Lấy 450 ml dung dịch X cho tác dụng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,15M và KOH 0,05M, thu được dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là

- A. 0,225.** B. 0,155. C. 0,450. D. 0,650.

Câu 10: Trộn lẫn 3 dung dịch H_2SO_4 0,1M, HNO_3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Lấy 300 ml dung dịch X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M, thu được dung dịch Z có pH = 2. Giá trị V là

- A. 0,134 lít.** B. 0,214 lít. C. 0,414 lít. D. 0,424 lít.

Câu 11: Dung dịch X thu được khi trộn một thể tích dung dịch H_2SO_4 0,1M với một thể tích dung dịch HCl 0,2M. Dung dịch Y chứa NaOH 0,2M và $Ba(OH)_2$ 0,1M. Đổ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 200 ml dung dịch X có pH = a và m gam kết tủa Y. Giá trị của a và m lần lượt là

- A. 13 và 1,165.** B. 2 và 2,330. C. 13 và 2,330. D. 7 và 1,165.

Câu 12: Trộn các dung dịch HCl 0,75M; HNO_3 0,15M; H_2SO_4 0,3M với các thể tích bằng nhau thì được



dung dịch X. Trộn 300 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,25M, thu được m gam kết tủa và dung dịch Y có $\text{pH} = x$. Giá trị của x và m lần lượt là:

- A. 1 và 2,23 gam. **B. 1 và 6,99 gam.** C. 2 và 2,23 gam. D. 2 và 1,165 gam.

Câu 13: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H_2SO_4 0,05M với 300 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ nồng độ xM, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có $\text{pH} = 13$. Giá trị của x và m là

- A. $x = 0,015$; $m = 2,33$. **B. $x = 0,150$; $m = 2,33$.**
C. $x = 0,200$; $m = 3,23$. D. $x = 0,020$; $m = 3,23$.

Câu 14: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp H_2SO_4 0,1M và HNO_3 0,3M, dung dịch Y chứa hỗn hợp $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,2M và KOH 0,1M. Lấy a lít dung dịch X cho vào b lít dung dịch Y, thu được 1 lít dung dịch Z có $\text{pH} = 13$. Giá trị a, b lần lượt là

- A. 0,5 lít và 0,5 lít. B. 0,6 lít và 0,4 lít.
C. 0,4 lít và 0,6 lít. D. 0,7 lít và 0,3 lít.

Câu 15: Dung dịch X gồm HCl 0,2M; HNO_3 0,3M; H_2SO_4 0,1M; HClO_4 0,3M, dung dịch Y gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M; $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,15M. Cần trộn X và Y theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để được dung dịch có $\text{pH} = 13$?

- A. 11: 9. **B. 9 : 11.** C. 101 : 99. D. 99 : 101.

Câu 16: Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01M là

- A. 2.** B. 12. C. 10. D. 4.

Câu 17: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

- A. 4. B. 3. **C. 2.** D. 1.

Câu 18: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H_2SO_4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH bằng

- A. 1,2. B. 1,0. C. 12,8. **D. 13,0.**

Câu 19: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO_3 có $\text{pH}=2$ cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là

- A. 300. **B. 150.** C. 200. D. 250



3. Phản ứng của đơn bazơ (NaOH, KOH) với đa axit (H_2SO_4 , H_3PO_4)

Câu 1: Trộn lẫn 500 ml dung dịch NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch H_2SO_4 0,1M, thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y có các sản phẩm là

- A. Na_2SO_4 . B. $NaHSO_4$.
C. Na_2SO_4 và $NaHSO_4$. D. Na_2SO_4 và NaOH.

Câu 2: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H_3PO_4 0,5M, muối thu được có khối lượng là

- A. 14,2 gam. B. 15,8 gam. C. 16,4 gam. D. 11,9 gam.

Câu 3: Cho 100 ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100 ml dung dịch H_3PO_4 aM, thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị của a là

- A. 1. B. 1,5. C. 1,25. D. 1,75.

Câu 4: Trộn lẫn 500 ml dung dịch H_2SO_4 0,3M với 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH aM, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 19,1 gam muối. Giá trị của a là

- A. 0,5. B. 1. C. 1,5. D. 2.

Câu 5: Cho 14,2 gam P_2O_5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8%, thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm tương của chất tan trong X là

- A. Na_2HPO_4 và 11,2%. B. Na_3PO_4 và 7,66%.
C. Na_2HPO_4 và 13,26%. D. Na_2HPO_4 ; NaH_2PO_4 đều là 7,66%.

Câu 6: Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H_3PO_4 1M. Khối lượng các muối thu được trong dung dịch là

- A. 10,44 gam KH_2PO_4 ; 8,5 gam K_3PO_4 . B. 10,44 gam K_2HPO_4 ; 12,72 gam K_3PO_4 .
C. 10,44 gam K_2HPO_4 ; 13,5 gam KH_2PO_4 . D. 13,5 gam KH_2PO_4 ; 14,2 gam K_3PO_4 .

IV. Phản ứng trao đổi

1. Sử dụng bảo toàn điện tích

Câu 1: Một cốc nước có chứa a mol Ca^{2+} , b mol Mg^{2+} , c mol Cl^- , d mol HCO_3^- . Hệ thức liên hệ giữa a, b, c,



d là

- A. $2a+2b=c-d$. B. $a+b=c+d$. C. $2a+2b=c+d$. D. $a+b=2c+2d$.

Câu 2: Có hai dung dịch X, Y, mỗi dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: K^+ (0,15 mol); Fe^{2+} (0,1 mol); NH_4^+ (0,2 mol); H^+ (0,2 mol); Cl^- (0,1 mol); SO_4^{2-} (0,15 mol); NO_3^- (0,2 mol); CO_3^{2-} (0,075 mol). Thành phần của X, Y là:

- A. X: Fe^{2+} , H^+ , SO_4^{2-} , Cl^- và Y: K^+ , NH_4^+ , CO_3^{2-} , NO_3^- .
B. X: NH_4^+ , H^+ , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} và Y: K^+ , Fe^{2+} , NO_3^- , Cl^- .
C. X: Fe^{2+} , H^+ , NO_3^- , SO_4^{2-} và Y: K^+ , NH_4^+ , CO_3^{2-} , Cl^- .
D. X: Fe^{2+} , K^+ , SO_4^{2-} , NO_3^- và Y: H^+ , NH_4^+ , CO_3^{2-} , Cl^- .

Câu 3: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na^+ ; 0,1 mol Mg^{2+} ; 0,05 mol Ca^{2+} ; 0,15 mol HCO_3^- và x mol Cl^- . Giá trị của x là

- A. 0,35. B. 0,3. C. 0,15. D. 0,20.

Câu 4: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu^{2+} , 0,03 mol K^+ , x mol Cl^- và y mol SO_4^{2-} . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là

- A. 0,01 và 0,03. B. 0,02 và 0,05. C. 0,05 và 0,01. D. 0,03 và 0,02.

Câu 5: Một dung dịch chứa 0,25 mol Cu^{2+} ; 0,2 mol K^+ ; a mol Cl^- và b mol SO_4^{2-} . Tổng khối lượng muối có trong dung dịch là 52,4 gam. Giá trị của a và b lần lượt là

- A. 0,4 và 0,15. B. 0,2 và 0,25. C. 0,1 và 0,3. D. 0,5 và 0,1.

Câu 6: Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na^+ ; 0,1 mol Ba^{2+} ; 0,05 mol Mg^{2+} ; 0,2 mol Cl^- và x mol NO_3^- . Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

- A. 68,6. B. 53,7. C. 48,9. D. 44,4.

Câu 7: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na^+ ; 0,02 mol Ca^{2+} ; 0,02 mol HCO_3^- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là

- A. Cl^- và 0,01. B. NO_3^- và 0,03. C. CO_3^{2-} và 0,03. D. OH^- và 0,03.

Câu 8: Dung dịch X có 0,1 mol K^+ ; 0,2 mol Mg^{2+} ; 0,1 mol Na^+ ; 0,2 mol Cl^- và a mol Y^- . Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y^- và giá trị của m là



- A. OH^- và 30,3. B. NO_3^- và 23,1. **C. NO_3^- và 42,9.** D. OH^- và 20,3.

Câu 9: Dung dịch X gồm 0,1 mol K^+ ; 0,2 mol Mg^{2+} ; 0,1 mol Na^+ ; 0,2 mol Cl^- và a mol Y^{2-} . Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y^{2-} và giá trị của m là

- A. SO_4^{2-} và 56,5. B. CO_3^{2-} và 30,1. **C. SO_4^{2-} và 37,3.** D. CO_3^{2-} và 42,1.

Câu 10: Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg^{2+} , Ba^{2+} , Ca^{2+} , 0,1 mol Cl^- và 0,2 mol NO_3^- . Thêm dần V lít dung dịch K_2CO_3 1M vào X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là

- A. 150 ml.** B. 300 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.

Câu 11: Dung dịch X có chứa Ba^{2+} (x mol), H^+ (0,2 mol), Cl^- (0,1 mol), NO_3^- (0,4 mol). Cho từ từ dung dịch K_2CO_3 1M vào dung dịch X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, thấy tiêu tốn V lít dung dịch K_2CO_3 . Giá trị của V là

- A. 0,15. B. 0,4. C. 0,2. **D. 0,25.**

Câu 12: Dung dịch X chứa các cation gồm Mg^{2+} , Ba^{2+} , Ca^{2+} và các anion gồm Cl^- và NO_3^- . Thêm từ từ 250 ml dung dịch Na_2CO_3 1M vào dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Tổng số mol các anion có trong dung dịch X là

- A. 1,0. B. 0,25. C. 0,75. **D. 0,5.**

Câu 13: Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na^+ , 0,02 mol SO_4^{2-} , và x mol OH^- . Dung dịch Y có chứa ClO_4^- , NO_3^- và y mol H^+ ; tổng số mol ClO_4^- , NO_3^- là 0,04 mol. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H_2O) là

- A. 1.** B. 12. C. 13. D. 2.

Câu 14: Dung dịch X chứa a mol Na^+ ; b mol HCO_3^- ; c mol CO_3^{2-} và d mol SO_4^{2-} . Để tạo kết tủa lớn nhất người ta phải dùng 100 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ x mol/l. Biểu thức tính x theo a và b là

- A. $x = \frac{a+b}{0,1}$. **B. $x = \frac{a+b}{0,2}$.** C. $x = \frac{a+b}{0,3}$. D. $x = \frac{a+b}{2}$.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 ml dung dịch HCl 1M và H_2SO_4 0,5M, thấy thoát ra 5,6 lít H_2 (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất?

- A. 300 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. **D. 600 ml.**



Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H_2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H_2SO_4 , tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

- A. 13,70 gam. **B. 18,46 gam.** C. 12,78 gam. D. 14,62 gam.

Câu 17: Cho 4,93 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 480 ml dung dịch H_2SO_4 0,5M (loãng). Sau khi phản ứng kết thúc cho tiếp V ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,1M và NaOH 0,7M vào cốc để kết tủa hết các ion Mg^{2+} và Zn^{2+} trong dung dịch. Giá trị V sẽ là

- A. 486 ml. **B. 600 ml.** C. 240 ml. D. 640 ml.

Câu 18: Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: K^+ : 0,3 mol; Mg^{2+} : 0,2 mol; NH_4^+ : 0,5 mol; H^+ : 0,4 mol; Cl^- : 0,2 mol; SO_4^{2-} : 0,15 mol; NO_3^- : 0,5 mol; CO_3^{2-} : 0,3 mol. Một trong hai dung dịch trên chứa các ion là

- A. K^+ , Mg^{2+} , SO_4^{2-} , Cl^- . **B. K^+ , NH_4^+ , CO_3^{2-} , Cl^- .**
C. NH_4^+ , H^+ , NO_3^- , SO_4^{2-} . D. Mg^{2+} , H^+ , SO_4^{2-} , Cl^- .

Câu 19: Một dung dịch có chứa các ion : Mg^{2+} (0,05 mol), K^+ (0,15 mol), NO_3^- (0,1 mol), và SO_4^{2-} (x mol). Giá trị của x là

- A. 0,05. **B. 0,075.** C. 0,1. D. 0,15.

Câu 20: Dung dịch X chứa các ion: Fe^{2+} (0,1 mol), Al^{3+} (0,2 mol), Cl^- (x mol), SO_4^{2-} (y mol). Cô cạn dung dịch X thu được 46,9 gam muối rắn. Giá trị của x và y lần lượt là

- A. 0,1 và 0,35. B. 0,3 và 0,2. **C. 0,2 và 0,3.** D. 0,4 và 0,2.

Câu 21: Dung dịch X gồm a mol Na^+ ; 0,15 mol K^+ ; 0,1 mol HCO_3^- ; 0,15 mol CO_3^{2-} và 0,05 mol SO_4^{2-} . Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

- A. 33,8 gam.** B. 28,5 gam. C. 29,5 gam. D. 31,3 gam.

Câu 22: Dung dịch X gồm 0,3 mol K^+ ; 0,6 mol Mg^{2+} ; 0,3 mol Na^+ ; 0,6 mol Cl^- và a mol Y^{2-} . Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y^{2-} và giá trị của m là

- A. SO_4^{2-} và 169,5. B. CO_3^{2-} và 126,3. **C. SO_4^{2-} và 111,9.** D. CO_3^{2-} và 90,3.

Câu 23: Dung dịch X có chứa: Mg^{2+} , Ba^{2+} , Ca^{2+} và 0,2 mol Cl^- , 0,3 mol NO_3^- . Thêm dần dần dung dịch Na_2CO_3 1M vào dung dịch X cho đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại. Hỏi thể tích dung dịch Na_2CO_3 đã thêm vào là bao nhiêu?



- A. 300 ml. B. 200 ml. C. 150 ml. **D. 250 ml.**

Câu 24: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

- A. 57 ml. B. 50 ml. **C. 75 ml.** D. 90 ml.

2. Sử dụng phương trình ion rút gọn và bảo toàn điện tích

Câu 1: Cho dung dịch Ba(OH)₂ đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion NH₄⁺, SO₄²⁻, NO₃⁻, thu được 23,3 gam kết tủa và 6,72 lít (đktc) khí. Nồng độ mol/l của (NH₄)₂SO₄ và NH₄NO₃ trong dung dịch X là bao nhiêu?

- A. 1,5M và 2M. **B. 1M và 1M.** C. 1M và 2M. D. 2M và 2M.

Câu 2: Trộn dung dịch chứa Ba²⁺; 0,06 mol OH⁻, 0,02 mol Na⁺ với dung dịch chứa 0,04 mol HCO₃⁻, 0,03 mol CO₃²⁻ và Na⁺. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là

- A. 1,97. B. 7,88. C. 5,91. **D. 3,94.**

Câu 3: Dung dịch X chứa các ion: CO₃²⁻, SO₃²⁻, SO₄²⁻, 0,1 mol HCO₃⁻ và 0,3 mol Na⁺. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)₂ 1M vào X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là

- A. 0,15. B. 0,25. **C. 0,20.** D. 0,30.

Câu 4: Dung dịch E chứa các ion Mg²⁺, SO₄²⁻, NH₄⁺, Cl⁻. Chia dung dịch E ra hai phần bằng nhau: Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần hai tác dụng với dung dịch BaCl₂ dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng

- A. 6,11gam.** B. 3,055 gam. C. 5,35 gam. D. 9,165 gam.

Câu 5: Dung dịch X chứa các ion: Fe³⁺, SO₄²⁻, NH₄⁺, Cl⁻. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa. Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl₂, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

- A. 3,73 gam. B. 7,04 gam. **C. 7,46 gam.** D. 3,52 gam.

Câu 6: Có 500 ml dung dịch X chứa Na⁺, NH₄⁺, CO₃²⁻ và SO₄²⁻. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với



lượng dư dung dịch HCl, thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl_2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH_3 (đktc). Khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X là

- A. 14,9 gam. B. 11,9 gam. C. 86,2 gam. D. 119 gam.

Câu 7: Dung dịch X gồm Zn^{2+} , Cu^{2+} , Cl^- . Để kết tủa hết ion Cl^- trong 200 ml dung dịch X cần 400 ml dung dịch AgNO_3 0,4M. Khi cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch X thu được kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Nồng độ mol của Zn^{2+} trong dung dịch X là

- A. 0,2M. B. 0,3M. C. 0,4M. D. 0,1M.

Câu 8: Có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na_2CO_3 0,1 mol/l và $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 0,25 mol/l. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl_2 và CaCl_2 vào dung dịch đó. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa X và dung dịch Y. Phần trăm khối lượng các chất trong X là

- A. 50%, 50%. B. 35,5%, 64,5%. C. 49,62%, 50,38%. D. 25,6%, 74,4%.

Câu 9: Hỗn hợp chất rắn X gồm 6,2 gam Na_2O , 5,35 gam NH_4Cl , 8,4 gam NaHCO_3 và 20,8 gam BaCl_2 . Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam chất tan. Giá trị m là

- A. 42,55. B. 11,7. C. 30,65. D. 17,55.

Câu 10: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca^{2+} ; 0,3 mol Mg^{2+} ; 0,4 mol Cl^- và a mol HCO_3^- . Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

- A. 49,4 gam. B. 28,6 gam. C. 37,4 gam. D. 23,2 gam.

Câu 11: Hòa tan hết một lượng Na vào dung dịch HCl 10%, thu được 46,88 gam dung dịch gồm NaCl và NaOH và 1,568 lít H_2 (đktc). Nồng độ phần trăm của NaCl trong dung dịch thu được là

- A. 14,97. B. 12,48. C. 12,68. D. 15,38.

Câu 12: Cho m gam Ba vào 250 ml dung dịch HCl aM, thu được dung dịch X và 6,72 lít H_2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 55 gam chất rắn khan. Giá trị của a là

- A. 2,4M. B. 1,2M. C. 1,0M. D. 0,8M.

Câu 13: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO_3^{2-} ; 0,1 mol Na^+ ; 0,25 mol NH_4^+ và 0,3 mol Cl^- . Cho 270 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,2M vào dung dịch X và đun nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ giảm sau quá trình phản ứng là



- A. 7,015. **B. 6,761.** C. 4,215. D. 5,296.

Câu 14: Một dung dịch X có chứa $0,01 \text{ mol Ba}^{2+}$, $0,01 \text{ mol NO}_3^-$, $a \text{ mol OH}^-$ và $b \text{ mol Na}^+$. Để trung hoà $1/2$ dung dịch X người ta cần dùng 200 ml dung dịch HCl $0,1\text{M}$. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là

- A. 16,8 gam. **B. 3,36 gam.** C. 4 gam. D. 13,5 gam.

Câu 15: Có 100 ml dung dịch X gồm: NH_4^+ , K^+ , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} . Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)_2 dư, thu được $6,72 \text{ lít}$ (đktc) khí NH_3 và 43 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , thu được $2,24 \text{ lít}$ (đktc) khí CO_2 . Cô cạn dung dịch X thu được $m \text{ gam}$ muối khan. Giá trị của m là

- A. 24,9.** B. 44,4. C. 49,8. D. 34,2.

Câu 16: Dung dịch X chứa $0,12 \text{ mol Na}^+$; $x \text{ mol SO}_4^{2-}$; $0,12 \text{ mol Cl}^-$ và $0,05 \text{ mol NH}_4^+$. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)_2 $0,1\text{M}$ vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được $m \text{ gam}$ chất rắn khan. Giá trị của m là

- A. 7,190. B. 7,020. **C. 7,875.** D. 7,705.

Câu 17: Cho $7,8 \text{ gam}$ kali tác dụng với 1 lít dung dịch HCl $0,1\text{M}$, sau phản ứng thu được dung dịch X và $V \text{ lít}$ H_2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được $m \text{ gam}$ chất rắn khan. Giá trị của V và m lần lượt là

- A. 2,24 và 7,45. B. 1,12 và 3,725. C. 1,12 và 11,35. **D. 2,24 và 13,05.**

V. Tính lượng tính của Al(OH)_3 , Zn(OH)_2

Câu 1: Cho $1,05 \text{ mol NaOH}$ vào $0,1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Hỏi số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

- A. 0,65 mol. B. 0,45 mol. C. 0,75 mol. **D. 0,25 mol.**

Câu 2: Nhỏ từ từ $0,25 \text{ lít}$ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch gồm $0,024 \text{ mol FeCl}_3$; $0,016 \text{ mol}$; $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ và $0,04 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$ thu được $m \text{ gam}$ kết tủa. Giá trị của m là

- A. 2,568. B. 1,560. **C. 4,908.** D. 5,064.

Câu 3: Cho 200 ml dung dịch KOH $0,9\text{M}$; Ba(OH)_2 $0,2\text{M}$ vào 100 ml dung dịch H_2SO_4 $0,3\text{M}$ và $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ $0,3\text{M}$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

- A. 9,32 gam. B. 10,88 gam. C. 14 gam. **D. 12,44 gam.**



Câu 4: Hoà tan 0,24 mol FeCl_3 và 0,16 mol $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ vào dung dịch chứa 0,4 mol H_2SO_4 được dung dịch X. Thêm 1,3 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$ nguyên chất vào dung dịch X thấy xuất hiện kết tủa Y. Khối lượng tủa Y là

- A. 344,18 gam. B. 0,64 gam. C. 41,28 gam. **D. 246,32 gam.**

Câu 5: Cho 100 ml dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị nhỏ nhất của V là

- A. 1,2.** B. 2. C. 2,4. D. 0,6.

Câu 6: Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa a mol HNO_3 và 0,2 mol $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$. Để thu được 7,8 gam kết tủa thì giá trị lớn nhất của a thỏa mãn là

- A. 0,75 mol. B. 0,5 mol. **C. 0,7 mol.** D. 0,3 mol.

Câu 7: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 100 ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch X. Cho dung dịch X vào 200 ml dung dịch AlCl_3 0,5M, thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của x là

- A. 0,6M. B. 1M. **C. 1,4M.** D. 2,8M.

Câu 8: Cho 3,42 gam $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ vào 50 ml dung dịch NaOH, thu được 1,56 gam kết tủa và dung dịch X. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là

- A. 1,2M.** B. 2,4M. C. 3,6M. D. 1,2M và 3,6M.

Câu 9: Thêm 240 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl_3 nồng độ aM, khuấy đều tới khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,08 mol kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch NaOH 1M thì thấy có 0,06 mol kết tủa. Giá trị của a là

- A. 0,5M. B. 0,75M. C. 0,8M. **D. 1M.**

Câu 10: Tính V dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,01M cần thêm vào 100 ml dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,1M để thu được 4,275 gam kết tủa?

- A. 1,75 lít. **B. 1,5 lít.** C. 2,5 lít. D. 0,8 lít.

Câu 11: Cho V lít dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Biết dung dịch X hoà tan hết 2,04 gam Al_2O_3 . Giá trị của V là

- A. 0,16 lít hoặc 0,32 lít.** B. 0,24 lít.
C. 0,32 lít. D. 0,16 lít hoặc 0,24 lít.

Câu 12: Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H_2SO_4 0,1M, thu được dung dịch X. Thêm V lít dung



dịch NaOH 0,1M vào X cho đến khi kết tủa tan một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. V có giá trị là

- A. 1,1 lít. B. 0,8 lít. C. 1,2 lít. D. 1,5 lít.

Câu 13: Hòa tan hết m gam ZnSO_4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 20,125. B. 12,375. C. 22,540. D. 17,710.

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 7,74 gam một hỗn hợp gồm Mg, Al bằng 500 ml dung dịch gồm H_2SO_4 0,28M và HCl 1M, thu được 8,736 lít H_2 (đktc) và dung dịch X. Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,5M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất.

a. Số gam muối thu được trong dung dịch X là

- A. 38,93 gam. B. 38,95 gam. C. 38,97 gam. D. 38,91 gam.

b. Thể tích V là

- A. 0,39 lít. B. 0,4 lít. C. 0,41 lít. D. 0,42 lít.

c. Lượng kết tủa là

- A. 54,02 gam. B. 53,98 gam. C. 53,62 gam. D. 53,94 gam.

Câu 15: Hòa tan 4,6 gam Na vào dung dịch chứa 200 ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl_3 0,6M, thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị x là

- A. 0,7. B. 0,8. C. 0,5. D. 1,4.

Câu 16: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl_3 x mol/lít và $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl_2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỷ lệ x : y là

- A. 4 : 3. B. 3 : 4. C. 7 : 4. D. 3 : 2.

Câu 17: Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe^{3+} ; x mol Al^{3+} ; 0,25 mol SO_4^{2-} và y mol Cl^- . Cho 710 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1M vào dung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là

- A. 0,23 và 0,64. B. 0,5 và 0,45. C. 0,3 và 0,85. D. 0,3 và 0,45.

Câu 18: Cho 500 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,1M vào V ml dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là



- A. 75. **B. 150.** C. 300. D. 200.

Câu 19: Hòa tan hết m gam $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ vào H_2O thu được 300 ml dung dịch X. Cho 150 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, kết thúc các phản ứng thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác, cho 150 ml dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch chứa 0,55 mol KOH, kết thúc các phản ứng sinh ra a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

- A. 51,30 và 3,9. B. 51,30 và 7,8. **C. 25,65 và 3,9.** D. 102,60 và 3,9.

Câu 20: Thổi tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là

- A. 210 ml. B. 90 ml. **C. 180 ml.** D. 60 ml.

Câu 21: Cho 250 ml dung dịch NaOH 4M vào 50 ml dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Thành phần các chất trong X gồm

- A. Na_2SO_4 và NaOH. **B. Na_2SO_4 , NaAlO_2 , NaOH.**
C. Na_2SO_4 và $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. D. Na_2SO_4 và NaAlO_2 .

Câu 22: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl_3 ; 0,016 mol $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ và 0,04 mol H_2SO_4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 2,568. **B. 4,128.** C. 1,560. D. 5,064.

Câu 23: Cho 200 ml dung dịch AlCl_3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch KOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam.

a. Giá trị nhỏ nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

- A. 1,2.** B. 2. C. 2,4. D. 1,5.

b. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

- A. 1,2.** **B. 2.** C. 2,4. D. 2,5.

Câu 24: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ và 0,1 mol H_2SO_4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của V là

- A. 0,35. B. 0,25. C. 0,45. **D. 0,25 hoặc 0,45.**

Câu 25: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl_3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được



2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,2.

B. 0,8.

C. 0,9.

D. 1,0.

Câu 26: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch X và có 1,12 lít H_2 bay ra (đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol $AlCl_3$ vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 0,78 gam.

B. 1,56 gam.

C. 0,81 gam.

D. 2,34 gam.

Câu 27: Cho 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M, KOH 1M và $Ba(OH)_2$ 1,2M vào 100 ml dung dịch $AlCl_3$ xM thì thu được 9,36 gam kết tủa. Vậy nếu cho 200 ml dung dịch NaOH 1,2M vào 100 ml dung dịch $AlCl_3$ xM thì khối lượng kết tủa thu được và giá trị của x là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 11,70 gam và 1,6. B. 9,36 gam và 2,4. C. 6,24 gam và 1,4. D. 7,80 gam và 1,0.

Câu 28: Dung dịch X chứa 0,02 mol Al^{3+} ; 0,04 mol Mg^{2+} ; 0,04 mol NO_3^- ; x mol Cl^- và y mol Cu^{2+} . Cho X tác dụng hết với dung dịch $AgNO_3$ dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Mặt khác, cho 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 4,86.

B. 5,06.

C. 4,08.

D. 3,30.

Câu 29: Dung dịch X gồm 0,1 mol H^+ , z mol Al^{3+} , t mol NO_3^- và 0,02 mol SO_4^{2-} . Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và $Ba(OH)_2$ 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là:

A. 0,020 và 0,012. B. 0,020 và 0,120. C. 0,012 và 0,096. D. 0,120 và 0,020.

Câu 30: Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và $AlCl_3$ 0,4M. Sau phản ứng thu được kết tủa có khối lượng là $(m - 3,995)$ gam. m có giá trị là

A. 7,728 gam hoặc 12,788 gam.

B. 10,235 gam.

C. 7,728 gam.

D. 10,235 gam hoặc 10,304 gam.

Câu 31: X là dung dịch $Al_2(SO_4)_3$, Y là dung dịch $Ba(OH)_2$. Trộn 200 ml X với 300 ml Y được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml X với 500 ml Y được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X và Y lần lượt là:

A. 0,1M và 0,05M.

B. 0,1M và 0,2M.

C. 0,05M và 0,075M.

D. 0,075 và 0,1M.



Website **HOC247** cung cấp một môi trường **học trực tuyến** sinh động, nhiều **tiện ích thông minh**, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những **giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm** đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.

I. Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị – Tiết kiệm 90%

- **Luyện thi ĐH, THPT QG:** Đội ngũ **GV Giỏi, Kinh nghiệm** từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng các khóa **luyện thi THPTQG** các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.
- **Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán:** Ôn thi **HSG lớp 9** và **luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán** các trường **PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An** và các trường Chuyên khác cùng **TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn**.

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG

Học Toán Online cùng Chuyên Gia

- **Toán Nâng Cao THCS:** Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG.
- **Bồi dưỡng HSG Toán:** Bồi dưỡng 5 phân môn **Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp** dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: **TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn** cùng đội HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh học tập miễn phí

*HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí
HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí*

- **HOC247 NET:** Website học miễn phí các bài học theo **chương trình SGK** từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm miễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.
- **HOC247 TV:** Kênh **Youtube** cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.